11. Вычислить массу материальной пластинки треугольной формы с вершинами O,A,B, поверхностная плотность которой в точке M равна δ.

предпоследняя цифра студенческого $n = 0$

последняя цифра студенческого $k = 5$

Получим координаты точек

$O \quad (0;0)$

$A \quad (1;0)$

$B \quad (0;6)$

Закон распределения плотности вещевства пластинки

$\delta(x,y) = x + y$

Решение: изобразим пластинку на плоскости XOY:



Масса неоднородной пластинки выражается через двойной интеграл по формуле

$$m = \iint_{(D)} \delta(x,y)\,dx\,dy$$

В нашем случае область D - треугольник OAB, $\delta(x,y) = x + y$

Запишем уравнение прямой AB, используя уравнение прямой в отрезках;

$$\frac{x}{1} + \frac{y}{6} = 1 \qquad \text{откуда получим}$$

$y(x) = 6 - 6x$

область D задается как решение системы неравенств D:

$$\begin{cases} 0 \le x \le 1 \\ 0 \le y \le 6 - 6x \end{cases}$$

Вычислим массу m, переходя от двойного к повторному интегралу:

$$m = \iint\limits_{(D)} \delta(x,y)\,dx\,dy = \int_0^1 dx \int_0^{6-6x} x + y\,dy = \int_0^1 dx \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) \Bigg|_0^{6-6x} =$$

$$= \int_0^1 \frac{(6-6x)^2}{2} + x(6-6x)\,dx = \int_0^1 \frac{(6x-6)^2}{2} - x(6x-6)\,dx =$$

$$= 4x^3 - 15x^2 + 18x \Bigg|_0^1 =$$

$$= 4 \cdot 1^3 - 15 \cdot 1^2 + 18 - \left(4 \cdot 0^3 - 15 \cdot 0^2 + 18 \cdot 0\right) = 7$$