11. Вычислить массу материальной пластинки треугольной формы с вершинами O,A,B, поверхностная плотность которой в точке M равна δ.

предпоследняя цифра студенческого $n = 2$

последняя цифра студенческого $k = 5$

Получим координаты точек

$O \quad (0;\ 0)$

$A \quad (3;\ 0)$

$B \quad (0;\ 6)$

Закон распределения плотности вещевства пластинки

$$\delta(x,y) = x + y$$

Решение: изобразим пластинку на плоскости XOY:



Масса неоднородной пластинки выражается через двойной интеграл по формуле

$$m = \iint_{(D)} \delta(x,y)\, dx\, dy$$

В нашем случае область D - треугольник OAB, $\delta(x,y) = x + y$

Запишем уравнение прямой AB, используя уравнение прямой в отрезках;

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{6} = 1 \qquad \text{откуда получим}$$

$y(x) = 6 - 2x$

область D задается как решение системы неравенств D:

$$\begin{cases} 0 \le x \le 3 \\ 0 \le y \le 6 - 2x \end{cases}$$

Вычислим массу m, переходя от двойного к повторному интегралу:

$$m = \iint_{(D)} \delta(x,y)\,dx\,dy = \int_0^3 1\,dx \int_0^{6-2x} x + y\,dy = \int_0^3 1\,dx \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) \Bigg|_0^{6-2x} =$$

$$= \int_0^3 \frac{(6-2x)^2}{2} + x(6-2x)\,dx = \int_0^3 \frac{(2x-6)^2}{2} - x(2x-6)\,dx =$$

$$= -\frac{\left[x(2x-6) - \frac{(2x-6)^2}{2} \right]^2}{12} \Bigg|_0^3 =$$

$$= -\frac{\left[3(2\cdot 3-6) - \frac{(2\cdot 3-6)^2}{2} \right]^2}{12} - -\frac{\left[0(2\cdot 0-6) - \frac{(2\cdot 0-6)^2}{2} \right]^2}{12} = 27$$