11. Вычислить массу материальной пластинки треугольной формы с вершинами O,A,B, поверхностная плотность которой в точке M равна δ.

предпоследняя цифра студенческого $n = 7$

последняя цифра студенческого $k = 7$

Получим координаты точек

$O \quad (0;\ 0)$

$A \quad (8;\ 0)$

$B \quad (0;\ 8)$

Закон распределения плотности вещевства пластинки

$\delta(x,y) = x + y$

Решение: изобразим пластинку на плоскости XOY:



Масса неоднородной пластинки выражается через двойной интеграл по формуле

$$m = \iint_{(D)} \delta(x,y)\, dx\, dy$$

В нашем случае область D - треугольник OAB, $\delta(x,y) = x + y$

Запишем уравнение прямой AB, используя уравнение прямой в отрезках;

$$\frac{x}{8} + \frac{y}{8} = 1 \qquad \text{откуда получим}$$

$y(x) = 8 - x$

область D задается как решение системы неравенств D:

$$\begin{cases} 0 \le x \le 8 \\ 0 \le y \le 8 - x \end{cases}$$

Вычислим массу m, переходя от двойного к повторному интегралу:

$$m = \iint\limits_{(D)} \delta(x,y)\,dx\,dy = \int_0^8 1\,dx \int_0^{8-x} x + y\,dy = \int_0^8 1\,dx \left(xy + \frac{y^2}{2} \right) \Bigg|_0^{8-x} =$$

$$= \int_0^8 \frac{(8-x)^2}{2} + x(8-x)\,dx = \int_0^8 \frac{(x-8)^2}{2} - x(x-8)\,dx =$$

$$= 32x - \frac{x^3}{6} \Bigg|_0^8 =$$

$$= 32 \cdot 8 - \frac{8^3}{6} - \left(32 \cdot 0 - \frac{0^3}{6} \right) = 170.667$$